


## Ihre Ansprechpartner:



**Priv.-Doz. Dr. med. Darius Salehin**  
Chefarzt der Klinik für  
Frauenheilkunde und Geburtshilfe  
Leiter des Endometriosezentrums



**Dr. med. Chi Mi Scheible**  
Leitende Oberärztin der Klinik für  
Frauenheilkunde und Geburtshilfe  
Koordinatorin des  
gynäkologischen Krebszentrums

## Terminvereinbarung


### Sprechstunde:

Dienstags 9.00 - 19.00 Uhr und  
Donnerstags nach Vereinbarung

### Kontakt:

Telefon: (02161) 981-22 80  
Email: frauenklinik@mg.johanniter-kliniken.de

Bitte bringen Sie folgende Unterlagen mit:  
Fachärztliche Überweisung  
Medikamentenliste  
Vorbefunde (Arztbriefe, OP-Berichte)




**Johanniter GmbH -  
Ev. Krankenhaus Bethesda Mönchengladbach**

Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe  
Endometriosezentrum  
Gynäkologisches Krebszentrum

Ludwig-Weber-Straße 15  
41061 Mönchengladbach

Telefon: (02161) 981-0 (24 Stunden erreichbar)

[www.johanniter-kliniken.de](http://www.johanniter-kliniken.de)



## Vulva- und Dysplasie Sprechstunde

### Informationen für Patientinnen

**Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe**

Johanniter GmbH -  
Evangelisches Krankenhaus Bethesda Mönchengladbach  
Chefarzt Priv.-Doz. Dr. med. D. Salehin



**JOHANNITER**

Ev. Krankenhaus Bethesda  
Mönchengladbach

## Sehr geehrte Patientin,

Ihre Frauenärztin/Ihr Frauenarzt hat Sie in unserer Vulva- und Dysplasiesprechstunde überwiesen. Hierfür kommen unterschiedliche Gründe in Frage. Der häufigste ist ein auffälliges Abstrichergebnis bei der Krebsvorsorge. Das auffällige Abstrichergebnis kann durch entzündliche Veränderungen am Muttermund erzeugt werden und von alleine wieder vergehen. Bei ausgeprägten Veränderungen (Dysplasien) können Krebsvorstufen dahinter stecken, die wir näher abklären möchten.

### Wie läuft die Untersuchung in der Sprechstunde ab?

Nach der Eingangsbesprechung mit Ihnen erfolgt eine lupenmikroskopische Untersuchung (Kolkoskopie). Hierbei werden der Scheideneingang (Vulva), die Scheide (Vagina) und der Gebärmutterhals (Cervix) untersucht. Die Untersuchung erfolgt auf dem gynäkologischen Stuhl. Sie können an einem eigenen Monitor die Untersuchung live mitverfolgen.

Bei auffälligen kolposkopischen Befunden ist eine Gewebeentnahme notwendig. Diese wird in der Regel kaum gespürt. Lediglich kann es danach vorübergehend zu kleinen Schmierblutungen kommen. Eine Gewebeentnahme an der Vulva erfolgt grundsätzlich unter lokaler Betäubung.

Das entnommene Gewebe wird feingeweblich untersucht. Auf der Basis dieses Ergebnisses, des kolkoskopischen Bildes und unter Einbeziehung der zytologischen Abstriche kann die bestmögliche Therapie für Sie so belastungsarm und gewebeschonend wie möglich festgelegt werden. So können unnötige Operationen gerade bei jungen Frauen vermieden werden.

### Wie wird eine Dysplasie behandelt?

Ob bei einer Dysplasie eine Behandlung erforderlich ist, hängt vom Schweregrad der Veränderung ab. Eine spontane Heilung ohne Therapie ist bei leichtgradigen Gewebeveränderungen häufig. Hier steht die engmaschige Beobachtung im Vordergrund. Höhergradige Gewebeveränderungen können in der Regel schonend entfernt werden, um eine spätere Krebserkrankung zu vermeiden.

Dabei stehen mehrere moderne Therapieverfahren (Laserverdampfung, Argon-Beamer-Koagulation, Laserentfernung, Hochfrequenztechnik mit elektrischer Schlinge) zur Verfügung.



### Unser Leistungsspektrum

- Anamnese auf Grundlage der mitgebrachten Befunde in Rücksprache mit dem überweisenden Arzt oder der überweisenden Ärztin
- Differentialvideokolposkopie in HD Qualität mit Möglichkeit der live Verfolgung
- Histologische Abklärung suspekter Areale (Punchbiopsie, Stanzbiopsie, Leep-Resektion)
- Zytologische und histologische Abklärung sowie HPV-Diagnostik, falls indiziert
- Entscheidung über das weitere Vorgehen, Kontrolle oder Operation in Rücksprache
- Überprüfen des Therapieansprechens bei konservativen Maßnahmen